

Kombinationsmedicin (Bufomix, Symbicort, Seretide, Innovair, Relvar)



Kombinationsmedicin indeholder både langtidsvirkende anfaldsmedicin, som virker i 12 timer, og forebyggende medicin. Relvar virker i 24 timer. Bivirkningerne er det sammen som ved anfaldsmedicin og forebyggende inh medicin.

På Astma og Allergi Danmark's hjemmeside kan du se, hvordan du skal tage medicinen.

www.astma-allergi.dk



Astma-Allergi
Danmark




HUSK

- Undlad at tage "blå medicin" og kombinationsmedicin på undersøgelsesdagen
- Medbring din astmamedicin
- Medbring dit peakflow meter og dit pustegrej.

Klinik for børn & unge



Astmamedicin



Søndergade 1 B 2. sal - 8600 Silkeborg - tlf.: 86 84 82 00 - www.klinikforboern.dk

Anfaldsmedicin

I daglig tale kaldet “blå medicin”

Medicinen hedder: Airomir, Ventoline, Bricanyl og Buventol



Virkning:

- Musklerne udenpå luftrøret slapper af, luftvejene åbnes, vejrtrækningen bedres, så barnet bedre kan hoste evt slim op.
- Medicinen virker i løbet af få minutter og er i kroppen i op til 4 timer efter indtagelse.

Bivirkninger:

- Hyperaktivitet i en kort periode efter indtagelse af medicinen.
- Nogle kan komme til at ryste på hænderne og føle indre uro
- Enkelte får hurtig puls og føler lidt hjertebanken.

Bivirkningerne er IKKE farlige og går hurtigt over igen. Hvis du får disse bivirkninger og det generer dig, skal du tale med os i klinikken om det til konsultationerne, da vi så kan skifte dig til en anden slags anfaldsmedicin.

Forebyggende inhalationsmedicin

I daglig tale kaldet “brun” eller “orange” medicin

Medicinen hedder: Aerobec, Spirocort, Flixotide, og Giona.



Forebyggende medicin indeholder binyrebarkhormon. Hormonet virker primært i luftrøret. Resten af kroppen påvirkes sjældent af medicinen.

Virkning:

- Den forebyggende inhalationsmedicin fjerner hævelsen og irritationen af slimhinden i luftrøret.
- Den virker først efter flere dage, og den fulde effekt opnåes efter én til flere måneders behandling.

Bivirkninger:

Binyrebark hormon som suges direkte ned i luftrøret giver almindeligvis ingen eller kun få bivirkninger, som kan være følgende:

- Svamp i mundhulen.
- Hæshed.
- Kortvarig påvirkning af højdevæksten, hvilket vil blive indhentet senere, og sjældent påvirker sluthøjden.
- Spacer behandling med maske kan medføre irritation af huden omkring munden. Det kan hjælpe, at vaske med en våd klud og smøre barnet med en fed crème omkring munden.

Bivirkninger kan undgås ved at børste tænder, skylle mund og drikke vand for at skylle den øverste del af spiserøret.