


# Klinik for børn & unge



## Urinen dyrkes på dyrkningsmedier natten over

Der er svar på urinprøven næste dag, og man får at vide, hvilke bakterier, der er tale om og hvilken antibiotika der vil virke.

Du skal selv kontakte lægen for svar.



## Blærebetændelse og midtstråleurin



## Blæretændelse

Blæretændelse er infektion i blæren med bakterier, der oftest stammer fra tarmen.

Blæretændelse kan være årsag til

- Hyppige små vandladninger
- Svie ved vandladning
- Inkontinens
- Mavesmerter

Urinvejsinfektion optræder hyppigt ved fækalinkontinens og er en hyppig årsag til daginkontinens.

## Undersøgelse

Den vigtigste undersøgelse er en midtstråleurinprøve, som vi undersøger for bakterier ved urinstix og dyrkning.

Urinprøvesættet består af engangsvaskeklud, kop og spidsglas – husk selv at sætte navn og cpr.nr. på prøven.



## Midtstråleurin-prøve

En midtstråleurin er en urinprøve, hvor barnet først vaskes med mild sæbe og herefter med rent vand omkring genitalia. Dette er for at undgå forurening af urinprøven, som kan medføre unødigt behandling med antibiotika.

*Hos piger* vaskes helt inde fra urinrøret, mellem de små skamlæber, og bagud i ét strøg. Sæben vaskes væk på samme måde.

*Hos drenge* vaskes spidsen af penis først med sæbe og derefter med rent vand.

Herefter tisser barnet på toilettet og midt i strålen opsamles urinen i et rent bæger.

Der kan ikke anvendes kogte og afvaskede marmeladeglas eller lignende!

Urinaen hældes straks i det medfølgende sterile glas og afleveres i klinikken indenfor en time.

Prøven kan også laves i klinikken.

