

Behandling

Tablet Vermox, 3 gange med 2 ugers interval.
Hele familien behandles.

Smitte

Børneorm er meget smitsomt. Det smitter ved, at man får æg fra børneormen under neglene, som vi så afsætter på håndklæder, i sengetøjet, på bamserne og hinanden, på maden og i munden.

Hygiejne

Det er vigtigt at holde følgende hygiejneregler under de 6 ugers behandling:

- Vask alt sengetøj og håndklæder ved 60 grader hver gang i får en pille
- Sovedyrerne skal have samme tur, eller i fryseren i flere dage.
- Klip neglene
- Skrub neglene grundigt med neglebørste på alle i familien



Klinik for børn & unge



Børneorm



Børneorm

Forekommer hyppigt blandt børn i 5 - 10 års alderen. Flere personer i husstanden/institutionen er ofte smittet.

Symptomer

- Mavesmerter
- Numsekløe
- Søvnbesvær, rastløshed og irritabilitet.



Børneorm er en lille gulhvid orm, som er 8 - 13 mm x 0,5 mm. Den bor i tarmen og lægger æg ved numsehullet, når vi sover, og derfor klør det.

Diagnosen stilles ved analskrab for børneorm

Du skal bruge

- Tungespatel
- Klar tape
- 3 objektglas
- laboratorieseddel
- Transporttæske
- Indpakningspap
- Foret konvolut med adresse til mikrobiologerne




Chancen for "fangst" er størst, hvis prøven tages om morgenen før bad.

Vi vil gerne have 3 prøver, idet man ved en enkelt prøve kun påviser æg i ca. 50 % af tilfældene, mens man ved tre prøver øger fangsten til 90 %.

Sådan gør du:

- Læg tapen fast om tungespatelen med klisteret udad



- Gå ind til barnet og tag numseprøven, før han/hun står ud af sengen.
- Bed barnet om at presse lidt, så numsen åbner sig en smule.
- Hold tungespatlen fast mod numsehullet og pres ballerne sammen omkring tapen.
- Træk tapen væk igen
- Sæt tapen fast på objektglasset ned klisteret nedad.

- Kom en stregkode på objektglasset som vist på billedet
- Kør glasset ind i den lille transporttæske.
- Gentag proceduren næste dag
- Når du har tre prøver sendes de med posten til mikrobiologerne
- **Bare rolig, vi viser dig hvordan, og tager den første prøve i klinikken**